

Bột thông ngọt mọt khi mang thai

Viết bởi Administrator

Thứ ba, 12 Tháng 3 2013 16:13 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 15:17

Khi mang thai, sự thay đổi hormone sẽ ảnh hưởng đến nồng độ protein trên cơ thể người mẹ. Mọt cũng bị ảnh hưởng do có nhiều mạch máu nhỏ, vốn nhạy cảm với nồng độ protein huyết học trong thai kỳ.



ảnh minh họa

Bệnh thối ngò mọt khi mang thai

Viết bởi Administrator

Thứ ba, 12 Tháng 3 2013 16:13 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 15:17

Hầu hết các vấn đề về mọt thối ngò bìu mọt sau khi sinh. Tuy nhiên, thai phụ cần cẩn trọng khi mọt có những triệu chứng do bìu mọt khác các bệnh khác. Do đó, cần chú ý khi nhận thấy những dấu hiệu sau:

Sợ ngứa mọt: Trong ba tháng cuối thai kỳ, thai phụ thấy ngứa phù và khó nhìn mọt. Nguyên nhân do sự thay đổi hormone trong thai kỳ. Sợ ngứa mọt đi kèm với ngứa phù tay, chân. Ngoài ra, mọt có thể ngứa phù nặng hơn nếu có thể thiêu u nang và ăn nhiều muối. Để giảm ngứa phù, bệnh nên uống đủ nước (khoảng 1,8 - 2 lít nước/ngày), ăn nhiều rau xanh và trái cây, tránh các món ăn quá mặn.

Mọt mọt: Khi mang thai, giác mạc và thị giác trở nên dày hơn, làm cho quá trình tuần hoàn máu ở vùng mọt bị hạn chế. Đây là nguyên nhân khiến mọt bị giảm thị lực. Hiện tượng này thối ngò bìu mọt sau khi sinh. Nếu mọt gây những triệu chứng công việc, bệnh nên đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa mọt để được tư vấn, cần kính hoặc đeo kính giác trong suốt thai kỳ.

Mọt sưng trong mí mọt: Khi mang thai, tuần hoàn máu ở vùng mọt bị hạn chế, dễ gây tắc nghẽn, tạo thành những nốt sưng trong mí mọt. Ngoài ra, mọt sưng vì khu vực hoạt động dưới mí mọt cũng gây nên những nốt sưng. Để giảm ngứa thai phụ nên xuyên trang để mọt, hiện tượng này phù bìu hơn. Do đó, nên hạn chế khi trang để mọt. Để giảm ngứa, thai phụ nên hạn chế ăn chất béo và uống nhiều nước mát.

Khô mọt: Những dấu hiệu sáng trước mắt hoặc mờ đi khi nhìn lâu, xanh, chảy nước mắt ngứa, nhức... đó là những dấu hiệu cho thấy mọt khô. Để hạn chế tình trạng này, có thể nhúng nước muối sinh lý vào khô mọt, gây những triệu chứng sinh hoạt. Trong trường hợp đau nhiều, ngứa hoặc bệnh cần phải đi khám các cơ sở chuyên khoa mọt, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Phù võng mạc: Bệnh tiểu đường hoặc tăng huyết áp trong thai kỳ có thể gây bệnh chèn ép trên mạch máu võng mạc. Giai đoạn đầu, mạch máu nhỏ ở đáy mọt bị phình ra. Nếu không chữa trị kịp thời có thể dẫn đến co, bong võng mạc, mù, thậm chí gây bệnh chèn ép nghiêm trọng hơn nữa.

Do đó, thai phụ cần bệnh tăng huyết áp hoặc tiểu đường cần được theo dõi sát sao khám định kỳ, kiểm tra mọt thối ngò xuyên. Nhờ thế, bác sĩ sẽ sớm phát hiện và xử lý kịp thời những dấu hiệu bệnh thối ngò, giúp thai phụ tránh những bệnh đáng tiếc.

Bật thỏ ng ỏ mỏ t khi mang thai

Viỏ t bỏ i Administrator

Thỏ ba, 12 Thỏng 3 2013 16:13 - Lỏ n cỏ p nhỏ t cuỏ i Thỏ hai, 08 Thỏng 4 2013 15:17

BS. Hỏ ng Hỏ nh

Theo SKĐS