

Đề phòng bệnh chlamydia

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 18 Tháng 3 2013 13:40 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 15:16

Bệnh chlamydia là một bệnh truyền nhiễm virus cấp tính do một loại siêu vi khuẩn nhóm Paramyxoviridae gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ em lứa tuổi 5 - 14. Bệnh lây lan chủ yếu qua nước bọt khi người bệnh nói chuyện, ho hoặc hít bụi. Bệnh có thể đi u tr ở mắt, mũi, họng và truyền nhiễm hệ thống cao, ói mửa, nhức đầu hoặc bệnh sinh dục sởi, cần phải điều trị đặc biệt để tránh biến chứng đáng tiếc.

Triệu chứng của bệnh chlamydia

Người bệnh chlamydia sẽ có thời gian ủ bệnh trong vòng 2 - 3 tuần, thông thường vào khoảng 17 - 18 ngày. Trong thời gian này, người bệnh không có biểu hiện gì rõ rệt. Sau đó, người bệnh có biểu hiện sốt 38 - 39°C, đau cơ thể, người mệt mỏi, chán ăn, tuyến mang tai to dần và đau nhức, có thể đau tuyến nước bọt dưới hàm hoặc dưới lưỡi, đau khi há miệng hoặc khi nuốt.

Tuyến mang tai sưng to kèm đau nhức ở mặt bên, lan dần sang tuyến mang tai bên kia và sưng to dần khoảng 1 tuần thì tụt xuống bình thường. Mặt da của tuyến mang tai thường đỏ, không nóng và sờ vào có cảm giác đàn hồi.

Đề phòng bệnh chlamydia ở trẻ em

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 18 Tháng 3 2013 13:40 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 15:16



