L□ng ru□t là m□t c□p c□u ngo□i khoa th□□ng g□p □ tr□ nh□. M□c dù con s□ th□ng kê ch□a đ□□c đ□y đ□, t□ l□ m□c b□nh vào kho□ng 3 - 5 tr□□ng h□p trên 1.000 tr□. B□nh có th□ x□y ra □ m□i l□a tu□i nh□ng hay g□p nh□t là tu□i 5 - 9 tháng, đ□c bi□t là nh□ng tr□ b□ b□m. Tr□ trên 2 tu□i, t□ l□ m□c ch□ vào kho□ng 15% và t□ l□ này càng gi□m khi tr□ l□n lên. Th□ng kê cũng cho th□y tr□ em trai b□ l□ng ru□t chi□m t□i 70% và b□nh cũng th□□ng x□y ra vào mùa đông xuân.

Nguyên nhân nào gây nên l□ng ru□t?

L□ng ru□t x□y ra khi m□t đo□n ru□t không □ v□ trí bình th□□ng mà "chui" vào trong lòng m□t đo□n ru□t k□ c□n kèm theo là c□ các m□ch máu nuôi d□□ng đo□n ru□t đó.

Cho đ□n nay, có t□i 90% các ca l□ng ru□t không rõ nguyên nhân. M□t s□ tr□□ng h□p đ□□c cho là do các kh□i u, polýp c□a ru□t. Các y□u t□ này có th□ làm thay đ□i nhu đ□ng c□a ru□t d□n t□i vi□c các đo□n ru□t "chui" vào nhau. Viêm nhi□m c□a ru□t cũng là m□t tác nhân thu□n l□i cho l□ng ru□t x□y ra. Trong m□t s□ nghiên c□u, ng□□i ta đã nh□n th□y t□ l□ l□ng ru□t khá cao □ tr□ em b□ nhi□m Rotavirus, lo□i virut th□□ng gây nôn, tiêu ch□y c□p □ tr□. Các y□u t□ nh□ tiêu ch□y kéo dài, các s□o t□n th□□ng □ ru□t, dính ru□t… cũng có th□ là tác nhân gây l□ng ru□t m□c dù ch□a đ□□c ch□ng minh rõ ràng. B□t th□□ng v□ gi□i ph□u □ ru□t, ti□n s□ đã b□ l□ng ru□t và tr□ em nam là nh□ng y□u t□ d□n t□i nguy c□ cao b□ l□ng ru□t.

Bi□u hi□n khi tr□ b□ l□ng ru□t

Khi tr□ b□ l□ng ru□t có th□ d□ dàng nh□n th□y các bi□u hi□n b□t th□□ng nh□ tr□ khóc thét vì đau b□ng, nôn m□a, b□ bú, sau đó b□ng tr□□ng căng, đ□i ti□n phân máu l□n nh□y và có th□ toàn máu t□□i. Các tri□u ch□ng có th□ d□u b□t trong m□t kho□ng th□i gian ng□n, sau đó l□i xu□t hi□n v□i m□c đ□ n□ng h□n: tr□ la hét, khóc thét t□ng c□n sau đó m□t l□, da xanh tái, ti□u ít, s□t cao, l□ đ□, hôn mê, d□u hi□u m□t n□□c n□ng c□ng v□i các bi□u hi□n c□a nhi□m khu□n nhi□m đ□c ho□c s□c do m□t n□□c hay s□c nhi□m khu□n.


Dung dịch barite
Barite lắng đọng
Khối lồng ruột